

بعد خضوعك لعملية نقل الدم تعليمات للمريض الخارجي غير المقيم في المستشفى

قد تواصل نشاطاتك الاعتيادية بعد مرور من ٤ حتى ٦ ساعات على خضوعك لعملية نقل الدم. وقد تأتي ردات فعل عملية نقل الدم متأخرة.

- إذا أصبت بالحمى المقرونة بالقشعريرة أو غير المقرونة بها خلال الساعات الثماني والأربعين التالية، فإنك قد تكون تبدي ردة فعل متأخرة على عملية نقل الدم.
- إذا لاحظت البول الداكن أو إصفراراً في البشرة أو شعرت بتعب غير اعتيادي خلال الأسبوعين التاليين، فإنك قد تكون تبدي ردة فعل متأخرة على عملية نقل الدم.

إذا كنت تعتقد أنك تبدي ردة فعل متأخرة على عملية نقل الدم، اتصل فوراً بأحد أفراد الفريق المعنى برعايتك الصحية.

 الاسم.
رقم الماتف:

11



8/1/03

This information is prepared specifically for patients participating in clinical research at the Warren Grant Magnuson Clinical Center at the National Institutes of Health and is not necessarily applicable to individuals who are patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your healthcare team.

Questions about the Clinical Center? OCCC@cc.nih.gov

Where applicable, brand names of commercial products are provided only as illustrative examples of acceptable products, and do not imply endorsement by NIH; nor does the fact that a particular brand name product is not identified imply that such product is unsatisfactory.

National Institutes of Health Warren Grant Magnuson Clinical Center Bethesda, Maryland 20892